Semillon rose

Vass7R03s541-545



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1054

Tenne Dan John Sur

Sémillon rose 10 R8 s-396-400







ANNEE: 1994 NOM Semillon rose. EMPLACEMENT 10 R8 1 396. 400 Bd. 43.89. mi cuche | Nbre | Débourrement | Nbre | yeux | début mi/déb grap Ferti-Véraison début mi/v Floraison Maturité lité début mi/f | mi/v fin fin 33 73x 0 Crappe : G M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: 54 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb De 7.3. 94 (0) Pépins : avec - apyrène Port: Vigueur :

NOM Semillar rose

EMPLACEMENT NO RP 1 396. 400

Souche Nbre Débourrement Nbre Graphe Ferti- Floraison Véraison Wexaison Début mi/deb Graphe Graphe												
3 0 6.3 13.3. 0 Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M-C Pour: Mill: Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène	Souche										fin	Maturité
	2 & 3 a 3 5 4	3		0	Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins	TC - 0 disc-s r : B-0 . s -	ph-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: hov-cyl dus ox - he	l-fus : inc -		

ANNEX: 1996 WOM Jernillon rose EMPLACEMENT. No R8 A 396. 400 Bd. 43-89 (m)													
iche	Nbre yeux	Débou début	mi/deb	Mbwe grap	Ferti-	rlo debut	raisor mi/f		Vé: début	mi/v	fin	Hatart!€	
1 2. 3 4 5	f		18,3 *	3	15 12.5 20.5 29.5 29.7 3.8 68 12.9 Grappe: G-M-P Dim: Compacité: L-F-C Pour: Mill: Baie: TC-G-H-P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N dus: inc-coloré Saveur: s-m-ar-fox-herb Pépins: avec-apyrène Fort: Vigueur:								
A.		,											

idinatan karambuntun kuntun d

N° d'ordre :

Sémillon rose 10 R8 s. 396-400.8-3

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 163 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18 /- sans villosité laineuse 279.

Blanc 191/- fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 2/18 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 2/38 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Lalver 41

nliminalijaisaaliinil

Nº d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Simillon rose 10 R84-396:400.0.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250 ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 94

dantarkantarkantarkantari)

Nº d'ordre :

Désignation :

Sémillon rose 10 R85-396-400.0.3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142/- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/12) - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274/- sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168/entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 1/71/ - ccurt 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

- Falvo 93

nlinderdendordendundendund

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année:

Observateur :

Code cépage : ~ Nom cépage : Semillon rose

Code clone:

Emplacement: No R 8 & 396 - Loso

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre Ø- rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes(1) - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence ? - présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) Ø- courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Vig 2/5

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.